

LIDOCAINA 700 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO (VERSATIS®)

INDICACIONES APROBADAS PARA SU VISADO

1. Alivio sintomático del dolor neuropático asociado a infección previa por herpes zoster (**neuralgia posherpética**, NPH) en adultos.

2. Tratamiento del dolor por neuropatía diabética localizada u otros **dolores neuropáticos localizados**, como alternativa a los tratamientos de primera y segunda línea; si persiste dolor moderado/intenso **tras ineficacia, intolerancia o contraindicación a terapias de escalones terapéuticos previos**.

La duración del tratamiento debe limitarse a **4 semanas**, tras las cuales se reevaluará su eficacia y recalculará la cantidad de apósitos necesarios en su caso.

2.1. Se consideran tratamientos de **primera línea**:

2.1.1.1. Un antidepresivo tricíclico como **amitriptilina**.

2.1.1.2. Un gabapentiniode como **gabapentina**.

2.1.1.3. Un antidepresivo dual (serotonina y noradrenalina) como **duloxetina**.

2.2. Se consideran segunda línea de tratamiento:

2.2.1.1. Añadir **un segundo fármaco** de distinto grupo, de entre los de primera línea.

2.2.1.2. Tramadol, otros opioides, otros antiepilépticos.

Fuentes: Dictamen del Comité Técnico para la Utilización de Medicamentos en Situaciones Especiales y de los No Incluidos en la Financiación del SNS. 31 de octubre de 2018.

CADIME. Algoritmo de tratamiento farmacológico del dolor neuropático (agosto, 2017).
(http://www.cadime.es/docs/algoritmos/CADIME_ALGORITMO_TTO_DOLOR-NEUROPATICO_.pdf)

UptoDate. Neuropathic pain: Pharmacologic approach.
(https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PC%2F58265&topicKey=ANEST%2F2785&search=dolor%20neurop%C3%A1tico&rank=1~150&source=see_link)